

# Vida Farmácias®

## DESCONTOS DE ATÉ 70% EM TODOS OS MEDICAMENTOS



Aproveite ainda mais o seu **CARTÃO FIDELIDADE** com o aplicativo grátis **VIDA FARMÁCIAS.**



**BAIXE AGORA. É GRÁTIS**  
DISPONÍVEL PARA IOS E ANDROID



Validade destas ofertas: 16/04/2018 a 31/05/2018.

**Preço ESPECIAL** no



**MUCOFAN**  
Xarope Pediátrico 100mg/5ml  
100ml  
**UNIÃO QUÍMICA**  
De: R\$ 12,98  
Por: **R\$ 9,99** cada



**MUCOFAN**  
Xarope Adulto 250mg/5ml  
100ml  
**UNIÃO QUÍMICA**  
De: R\$ 20,82  
Por: **R\$ 14,99** cada



**PARACETAMOL**  
200mg/ml Gotas  
15ml  
**GREENPHARMA**  
De: R\$ 6,79  
Por: **R\$ 1,99** cada



**ASSEPTICARE**  
10mg/ml  
30ml  
**NEO QUÍMICA**  
De: R\$ 11,93  
Por: **R\$ 6,75** cada



**PARACETAMOL**  
750mg  
20 cp  
TEUTO  
De: R\$ 16,90  
Por: **R\$ 4,99** cada



**IBUPROFENO**  
100mg/ml Gotas  
20ml  
**GEOLAB**  
De: R\$ 25,71  
Por: **R\$ 7,25** cada



**BIO SOAK**  
solução para lentes de contato  
360ml + 120ml  
TEUTO  
De: R\$ 49,00  
Por: **R\$ 32,50** cada



**LUREPEL**  
Creme de Ureia 10%  
60g  
**UNIÃO QUÍMICA**  
De: R\$ 39,90  
Por: **R\$ 29,90** cada



**BISMU-JET**  
20ml GTS  
LEGRAND  
De: R\$ 26,80  
Por: **R\$ 15,40** cada

**Assepticare:** MS: 15584012/40036/Indicações: desinfecção e limpeza da pele e de pequenos ferimentos/Contra-indicações: para pacientes que apresentem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. **Paracetamol:** MS: 1.2019.0106.002-6/Indicações: é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais/Contra-indicações: para pacientes com alergia ao paracetamol ou a qualquer componente de sua fórmula. **Bismu-Jet:** MS: 105830102/Princípio Ativo: NEOMICINA SULF+MENTOL Indicações: auxiliar no tratamento das afecções bucais./Contra-indicações: pacientes que apresentem hipersensibilidade a seus componentes. **Ibuprofeno:** MS: 10917009/10076/Indicações: indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares/Contra-indicações: qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. /Contra-indicações: Não utilize ibuprofeno se você já teve qualquer alergia ou alguma reação incomum a qualquer um dos componentes da fórmula do produto. Este produto contém ibuprofeno que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. **Paracetamol 750mg:** RDCP: MS: 789611000000/Princípio ativo: paracetamol 750 mg excipientes: q.s.p. com. rev. "estearato de magnésio, álcool polivinílico + dióxido de titânio + macrogol + talco, amidoglicolato de sódio, povidona, amido pré-gelatinizado, ácido estéarico, água purificada. Indicações: é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores associadas a artrites e cólicas menstruais. /Contra-indicações: você não deve tomar paracetamol se tiver hipersensibilidade (alergia) ao paracetamol ou aos outros componentes da fórmula. **IBUPROFENO GTS 100MG/ML 20 ML:** MS: 7899095/236-400/Princípio ativo: ibuprofeno. 100mg Excipientes: ácido cítrico, benzoato de sódio, dióxido de titânio, essência de taiti-frutti, glicol, goma xantana, polissorbato 80, propilenoglicol, sacarina sódica, sorbitol e água purificada. Indicações: O ibuprofeno é um medicamento indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares. **MUCOFAN ADULTO 100 ML:** MS: 7896002/49457/Princípio ativo: " contém 5% de excesso em relação ao rotulado. Excipientes: sacarose, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, aroma de cereja, ácido cítrico, metabissulfito de sódio, corante de eritrosina, hidróxido de sódio e água purificada. Indicações: MUCOFAN é destinado ao tratamento de problemas respiratórios, quando há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente. /Contra-indicações: MUCOFAN não deve ser utilizado por pacientes com úlceras no estômago ou no duodeno ou com alergia aos componentes da formulação. Este medicamento é contra-indicado para menores de 12 anos de idade. **MUCOFAN PED. 100 ML:** MS: 7896006/40419/Princípio ativo: carbocisteína 21 mg" contém 5% de excesso em relação ao rotulado. Excipientes: sacarose, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, aroma de cereja, ácido cítrico, metabissulfito de sódio, corante de eritrosina, hidróxido de sódio e água purificada. /Indicações: destinado ao tratamento de problemas respiratórios, quando há um excesso de secreções que podem piorar o estado do paciente. /Contra-indicações: não deve ser utilizado por pacientes com úlceras no estômago ou no duodeno ou com alergia aos componentes da formulação. MUCOFAN xarope pediátrico - Este medicamento é contra-indicado para menores de 2 anos de idade. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS ACIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA."



## ALERGIAS E INFECÇÕES

<b>*AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG + 125MG 12CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023508450173 AMOXICILINA + CLAVULANICO POTÁSSIO	R\$143,21	R\$ 79,90
<b>*AMOXICILINA 500MG 21CP/ GENÉRICO TEUTO</b> MS: 1037004470138 AMOXICILINA	R\$22,17	R\$ 15,99
<b>*AZITROMICINA 500MG 3CP/ GENÉRICO PHARLAB</b> MS: 1410706100024 AZITROMICINA	R\$20,11	R\$ 10,99
<b>*CEFALEXINA 500MG/ GENÉRICO TEUTO</b> MS: 1037003820011 CEFALEXINA	R\$17,23	R\$ 11,99
<b>*CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 14CP / GENÉRICO EMS</b> MS: 1023504780136 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	R\$34,12	R\$ 19,90
<b>DES LoratADINA 5MG 10CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023511710032 DESLORATADINA	R\$42,43	R\$ 19,99
<b>HIDROXIZINA 120ML/ GENÉRICO GEOLAB</b> MS: 1542301600050 HIDROXIZINA	R\$28,85	R\$ 21,99
<b>HISTAMIN 100 ML/ NEO QUÍMICA</b> MS: 1046500240027 MÉLEATO DE DEXCLOFENIRAMINA	R\$14,85	R\$ 10,90
<b>HISTAMIN 2MG 20CP/ NEO QUÍMICA</b> MS: 158403730014 MÉLEATO DE DEXCLOFENIRAMINA	R\$9,63	R\$ 7,85
<b>LORATADINA 100ML / GENÉRICO GEOLAB</b> MS: 1542300490014 LORATADINA	R\$27,76	R\$ 11,99
<b>NEO LORATADIN 10MG 12CP/ NEO QUÍMICA</b> MS: 1046502070 LORATADINA	R\$11,06	R\$ 7,85

## ANTICONCEPCIONAIS

<b>CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL 21CP / GENÉRICO MELCON</b> MS: 1.5989.0004.001-6 DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL	R\$18,41	R\$ 10,99
<b>DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL 21CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1045.002-9 DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL	R\$50,02	R\$ 24,90
<b>DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL 24CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1110.001-3 DROSPERINONA + ETINILESTRADIOL	R\$50,17	R\$ 24,90
<b>HORA H 1,5MG 1CP/ MELCON</b> MS: 1.558.9003006-1 LEVONORGESTREL	R\$16,33	R\$ 8,25

## ANTI-INFLAMATÓRIOS

<b>DICLOFENACO DIETILAMONIAO GEL 60G/ GENÉRICO TEUTO</b> MS: 1037003440014 DICLOFENACO DIETILAMONIO	R\$12,51	R\$ 6,99
<b>NEOCOFAN 85ML/ NEO QUÍMICA</b> MS: 1558403050080 DICLOFENACO DIETILAMÔNIO	R\$32,14	R\$ 19,90
<b>NEOSULIDA 100MG 12CP/ NEO QUÍMICA</b> MS: 1558403210037 NIMESULIDA	R\$11,06	R\$ 5,99

## CIRCULAÇÃO/ HIPERTENSÃO

<b>BESILATO DE ANLIDIPINO 5MG/ GENÉRICO PHARLAB</b> MS: 14107012300403 BESILATO DE ANLIDIPIPO	R\$22,81	R\$ 10,80
<b>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG 30CP/ GENÉRICO AUROBINDO</b> MS: 1516700460075 CLOPIDOGREL	R\$69,40	R\$ 31,50
<b>CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG 30CP/ GENÉRICO NEO QUÍMICA</b> MS: 1558404960031 CLORIDRATO DE SOTALOL	R\$55,59	R\$ 29,90
<b>CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG 20CP/ GENÉRICO NEO QUÍMICA</b> MS: 1558404960161 CLORIDRATO DE SOTALOL	R\$53,48	R\$ 27,90
<b>SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG 30CP/ GENÉRICO NEO QUÍMICA</b> MS: 1553700400123 SUCCINATO DE METOPROLOL	R\$57,46	R\$ 39,90
<b>VENAFLOM 450MG + 50MG 30CP/ TEUTO</b> MS: 107002670016 DIOSMINA + HESPERIDINA	R\$68,20	R\$ 29,90
<b>VERTIGIUM 10MG 50CP/ NEO QUÍMICA</b> MS: 1558400860022 FLUNARIZINA	R\$10,91	R\$ 7,99



## COLESTEROL/TRIGLICERÍDEOS

<b>ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG 30CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1119.002-0 ATORVASTATINA CÁLCICA	R\$66,77	R\$ 35,90
<b>ATORVASTATINA CÁLCICA 20MG 30CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1119.008-1 ATORVASTATINA CÁLCICA	R\$66,77	R\$ 35,90
<b>CIPROFIBRATO 100MG 30CP/ GENÉRICO NEOQUÍMICA</b> MS: 1558401950033 CIPROFIBRATO	R\$84,16	R\$ 31,50
<b>ORLISTATE CAPS 120 MG 42CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023510420030 ORLISTATE	R\$110,12	R\$ 79,99

## DESCONGESTIONANTES

<b>COLÍRIO TEUTO 20 ML/ TEUTO</b> MS: 1037001130018 METABISSULFITO + NAFÁ + AC BORI + OX SOL OFT	R\$9,82	R\$ 6,65
--	---------	----------

## DOR/ FEBRE

<b>DORALFLEX 30CP/ PHARMASCIENCE</b> MS: 1171700140051 ORFENADRINA + ASSOCIAÇÕES	R\$14,87	R\$ 9,99
<b>ENXAK 12CP/ CAZI</b> MS: 1071501900021 ERGOTAMINA + DIPIRONA + CAFEINA	R\$15,47	R\$ 9,99
<b>FLEXALGIN 30CP/ GEOLAB</b> MS: 1542300270030 CAFÉINA + CARISOPRODOL + DOCLOF. SÓDICO + PARACETAMOL	R\$32,59	R\$ 15,50
<b>TENSALDIN 20CP/ DELTA</b> MS: 1044000920018 CAFÉINA + DIPIRONA + ISOMETEPTENO	R\$14,51	R\$ 9,99

## ESTÔMAGO E INTESTINO

<b>ESOMEPRAZOL 20MG 28CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1182.003-2 ESOMEPRAZOL	R\$104,53	R\$ 49,90
<b>ESOMEPRAZOL 40MG 28CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1079.007-5 ESOMEPRAZOL	R\$218,51	R\$ 88,90
<b>GASTROGEL 20CP/ MEDQUÍMICA</b> MS: 1091700380026 HIDR. DE ALUMÍNIO + HIRD. MAGNÉSIO + SIMETICONA	R\$13,02	R\$ 7,99
<b>LEIBA OD. 20CP MASTIG. SAB. LARANJA/ UNIÃO QUÍMICA</b> MS: 6632500030013 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LIOFILIZADO	R\$33,39	R\$ 19,90
<b>MESALAZINA 800MG 30CP/ GENÉRICO NEO QUÍMICA</b> MS: 1558403500035 MESALAZINA	R\$117,90	R\$ 75,60
<b>OMENAX 20 MG 56CP/ GEOLAB</b> MS: 1542300190290 OMEPRAZOL	R\$30,26	R\$ 9,99
<b>PRAZY 40MG 28CP/ LEGRAND</b> MS: 1356905610083 PANTOPRAZOL	R\$58,66	R\$ 19,90
<b>REPOFLOR 200MG 6CP/ LEGRAND</b> MS: 1023504200040 SACCHAROMYCES BOULARDII	R\$33,04	R\$ 13,80
<b>SIMETICONA 15MG/ML 15ML/ GENÉRICO MEDQUÍMICA</b> MS: 1091700790011 SIMETICONA	R\$10,39	R\$ 6,99

## GRIPES/ RESFRIADOS

<b>EXPEC XPE 120 ML/ LEGRAND</b> MS: 1677302710010 OXOM + IOD POT + BENZ SÓDIO	R\$30,64	R\$ 19,99
<b>HEDRA EXPEC XPE 100ML/ LEGRAND</b> MS: 1677303 HEDERA HELIX	R\$42,73	R\$ 18,90
<b>SORINAN AD 30ML/ PHARMA</b> MS: 1171700060015 BENZALCONIO CLORETO + NAFAZOLINA + SÓDIO CLORETO	R\$9,47	R\$ 3,99

# Medicamentos



De:

## PELE/ MUCOSAS

<b>NISTATINA + OXIDO ZINCO POM 60G/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023506830041 NISTATINA + OXÍDIO ZINCO	R\$26,43	R\$ 19,90
<b>SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G/ GENÉRICO NEO QUÍMICA</b> MS: 155840315026 SULF. NEOMICINA+ BACITRACINA	R\$10,34	R\$ 6,99

R\$26,43	R\$ 19,90
R\$10,34	R\$ 6,99

## SAÚDE DO HOMEM

<b>SILDENAFILA 50MG 4CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023511170070 SILDENAFILA	R\$23,91	R\$ 9,99
<b>TADALAFILA 20MG C/1/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023511340073 TADALAFILA	R\$34,31	R\$ 9,99

R\$23,91	R\$ 9,99
R\$34,31	R\$ 9,99

## SISTEMA NERVOSO

* <b>CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG 30CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1.0235.1039.004-2 CLORIDRATO DE BUPROPIONA	R\$104,83	R\$ 59,80
* <b>CLORIDRATO DE FLOUOXETINA 20 MG 30CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023504640067 CLORIDRATO DE FLOUOXETINA	R\$44,00	R\$ 24,90
* <b>CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 30CP/ GENÉRICO EMS</b> MS: 1023509640146 CLORIDRATO DE PAROXETINA	R\$113,22	R\$ 49,90
* <b>CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG 30CP/ GENÉRICO ZYDUS</b> MS: 1565100100017 CLORIDRATO DE SERTRALINA	R\$50,39	R\$ 22,90

R\$104,83	R\$ 59,80
R\$44,00	R\$ 24,90
R\$113,22	R\$ 49,90
R\$50,39	R\$ 22,90

## SUPLEMENTOS/ FITOTERÁPICOS

<b>OSSOTRAT PLUS 60CP/ DELTA</b> MS: 104440012100104 CARBONATO DE CÁLCIO + ASSOC.	R\$59,90	R\$ 32,90
<b>SEAKALM 260MG 20CP/ NATULAB</b> MS: 1384100390027 PASSIFLORA ENCARNATA	R\$40,99	R\$ 17,50

R\$59,90	R\$ 32,90
R\$40,99	R\$ 17,50

**CLORIDRATO DE FLOUOXETINA:** MS: 102350470039/Princípio Ativo: FLOUOXETINA.Indicações: Este medicamento é indicado para o tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade. Também é indicado para o tratamento da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno dissociativo pré-menstrual (TPM), instabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade)/Contraindicações: Este medicamento não deve ser usado por pacientes alérgicos à fluoxetina ou a qualquer um dos seus excipientes. A fluoxetina não deve ser administrada a pacientes que estão utilizando inibidores da monoamina oxidase (IMAO), reversíveis ou não, como por exemplo, o sulfato de triptofanina (para uso em associação) e o moclobemida. Nesse caso, o paciente deverá esperar no mínimo 14 dias após a suspensão do tratamento com IMAO para iniciar o tratamento com fluoxetina. O paciente deverá deixar um intervalo de pelo menos 5 semanas (ou talvez mais, dependendo da avaliação médica, especialmente se fluoxetina for prescrito após o tratamento crônico e/ou em altas doses) após a suspensão do tratamento com fluoxetina e o início do tratamento com um IMAO ou tioridazina. O uso combinado de fluoxetina com um IMAO pode causar efeitos adversos graves, podendo ser fatal. Este medicamento é contraindicado para menores de 18 anos. **CLORIDRATO SERTRALINA:** MS: 1565100100017/Princípio Ativo: CLORIDRATO DE SERTRALINA.Indicações: Fluoreta de sertralina é indicado para o tratamento da depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, do transtorno obsessivo compulsivo em adultos e crianças acima de 6 anos de idade, do transtorno do pânico, do transtorno do estresse pós-traumático, da fobia social ou transtorno de ansiedade social e da síndrome da tensão pré-menstrual (ou transtorno dissociativo pré-menstrual./Contraindicações: cloridrato de sertralina não deve ser usado se você tiver história de alergia à sertralina ou a outros componentes da fórmula; se você estiver usando antidepressivos chamados de inibidores da monoamina oxidase (IMAO); ou se você tiver usado anteriormente AZITROMICINA. **AZITROMICINA:** MS: 1004308130111/Princípio Ativo: AZITROMICINA.Indicações: A azitromicina é indicada no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à azitromicina: em infecções do trato respiratório inferior (bronquite e pneumonia) e superior (nausea, faringe linfagite e traqueia), incluindo sinusite; (infecção nos seios da face), faringite (inflamação da faringe) ou amigdalite (inflamação das amígdalas); infecções da pele e tecidos moles (micoses, tendões, gonorreia); em otite média (infecção do ouvido médio) aguda e nas doenças sexualmente transmissíveis não complicadas nas genitais de homens e mulheres, causadas por bactérias Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. E também indicado no tratamento de cancro (Lesão de pele) devido a Haemophilus ducreyi (espécie de bactéria). Infecções que ocorrem junto com sifilis (doença sexualmente transmissível) devem ser excluídas. **Contraindicações:** Este medicamento é contraindicado se você tem história de hipersensibilidade (reações alérgicas) a azitromicina, eritromicina, a qualquer antibiótico macrolídeo (classe de antibióticos cujos pertence a azitromicina), cetolídido (ou classe de antibióticos) ou a qualquer componente da fórmula. **CEFALEXINA:** Indicações: Este medicamento é indicado para o tratamento das seguintes infecções causadas por bactérias sensíveis à cefalexina: sinusites (inflamação dos seios da face), infecções do trato respiratório inferior (otite média (inflamação do ouvido médio), infecções da pele e tecidos moles, infecções ósseas, infecções do trato geniturinário e infecções dentárias./Contraindicações: Pacientes com insuficiência renal grave devem usar a cefalexina com cuidado. Essa condição requer observação clínica e exames laboratoriais frequentes, pois a dose segura poderá ser menor do que a usualmente recomendada. Não há recomendações e advertências quanto ao uso de cefalexina por idosos. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. A cefalexina está classificada na categoria B do risco no gravidez. **CLORIDRATO DE CIPIROFLOXACINA:** MS: 1508700230095/Princípio Ativo: CLORIDRATO DE CIPIROFLOXACINA.Indicações: Infecções complicadas e não complicadas causadas por microrganismos sensíveis ao Ciprofloxacino. Pode ser considerado como tratamento recomendável em casos de pneumonias causadas por Klebsiella, Enterobacter, Proteus, E. coli, Pseudomonas, Branhamella, Legionella e Staphylococcus. Não deve ser usado como medicamento de primeira escolha no tratamento de pacientes ambulatoriais com pneumonia causada por Pneumococcus; otite média (otite média) e sinusites (sinusite), especialmente se a infecção for causada por organismos Gram-negativos, inclusive Pseudomonas e Staphylococcus; olhos; rins e/ou trato urinário eferente; órgãos biliares, inclusive anconeia, gonorreia e proctite; distúrbio abdominal (ex. infecções bacterianas do trato gastrointestinal ou do trato biliar e penterite); pele e tecidos moles, ossos e articulações; sepsis./Contraindicações: Não deve ser usado em casos de hipersensibilidade aos derivados quinolônicos. Exceção em casos de exacerbação da Triose félica associada ao Pseudomonas aeruginosa, o ciprofloxacino é contraindicado a crianças e adolescentes em fase de crescimento (entre 5 e 17 anos de idade), salvo quando os benefícios do tratamento puderem superar os riscos. **AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO:** MS: 1023508450173/ Princípio ativo: amoxicilina tri-hidratada/ 1000 400mg "equivalente a 85mg de amoxicilina, clavulanato de potássio"/48,90mg "equivalente a 125mg de ácido clavulanato de potássio" q.s.p. 1 com rev. Indicações: Amoxicilina + clavulanato de potássio para administração oral, duas vezes ao dia, é um antibiótico indicado para tratamento de infecções bacterianas (causadas por bactérias) comuns. **Contraindicações:** Amoxicilina + clavulanato de potássio não é indicado para pacientes com alergia a beta-lactâmicos, como penicilinas e cefalosporinas. **AMOXICILINA:** MS: 7896110000000 Princípio ativo: amoxicilina tri-hidratada/ 573,95 mg "equivalente a 500mg de amoxicilina, clavulanato de potássio" 907 mg "equivalente a 125 mg de ácido clavulanato, excipientes q.s.p. 1 com rev. Indicações: Este medicamento é um antibiótico utilizado no tratamento de infecções causadas por germes resistentes. Manter à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco. **Contraindicações:** Este produto não deve ser utilizado, com o prazo de validade vencido, sob risco de efeito desejado não ocorrer. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. **CLORIDRATO DE BUPROPIONA:** MS: 1023509640146 Princípio ativo: cloridrato de paroxetina hemi-hidratado/ 2,760 mg excipientes\*\* q.s.p. 1 com rev. "equivalente a 20,000 mg de paroxetina", 5 \*\* fósforo de cálcio dibásico, amido glicolado de sódio, estearato de magnésio, hipromelose+macrogol-3-diolado de tilinao e polissorbid 80, água purificada. Indicações: indicado para o tratamento de ADULTOS (que apresentam algumas das condições abaixo) - depressão (mesmo que, anteriormente, outros antidepressivos não tenham sido eficazes); - comportamento obsessivo ou compulsivo (incontrolável); - ataques de pânico, inclusive os causados por fobia (pavão) de lugares abertos (agorafobia); - ansiedade generalizada (sensação de muita ansiedade ou nervosismo em situações rotineiras); inclusive em indivíduos que exigem contato social - ansiedade seguida de evento traumático (transtorno de estresse pós-traumático); acidente de carro, acidente ou desastre natural, como enchente ou terremoto. **Contraindicações:** o cloridrato de paroxetina não é indicado no tratamento de crianças e adolescentes menores de 18 anos (ver, na seção Q, O Que Devo Saber Antes de Usar Este Medicamento) O Item Uso em Crianças e Adolescentes Menores de 18 Anos).

Contraindicação: hipersensibilidade aos componentes de fórmula de cada medicamento. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA QUEM APRESENTAR O CARTÃO FIDELIDADE VIDA FARMÁCIAS. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. OS PRODUTOS ACIMA SÃO MEDICAMENTOS. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULM."

- ◆ Oertas válidas enquanto durarem os estoques, salvo erros de impressão.
- Q Os produtos encardados podem não ser encontrados em todas as lojas associadas.
- ▢ Proteja o meio ambiente, não jogue este impresso na via pública.
- ◆ Imagens meramente ilustrativas.

